

THE: Smíšené Nashovo ekvilibrium ve strategických hrách (Mixed Nash Equilibria in Normal-Form Games)

Martin Hrubý

Brno University of Technology
Brno
Czech Republic

October 9, 2017

Čerpáno z:

- ▶ Fudenberg, D., Tirole, J.: Game Theory, The MIT Press, 1991
- ▶ Osborne, M., Rubinstein, A.: A Course in Game Theory, The MIT Press, 1994

Úvod:

- ▶ Strategické hry a základní pojmy. Ryzí (pure) strategie.
- ▶ Best response - $BR_i(s_{-i}) \subseteq S_i$, $i \in Q$, $s_{-i} \in S_{-i}$.
- ▶ Ryzí Nashovo ekvilibrium (PNE) - $s^* \in S$, žádný hráč nemá $s_i \in S_i$, že $U_i(s_i, s_{-i}^*) > U_i(s^*)$.
- ▶ Očekávaný zisk a s ním spojené smíšené chování.

Příklad hry bez PNE: Matching pennies

Každý hráč má penny. Tajně otočí svoje penny na heads/tails (tím volí strategii).

A/B	heads	tails
heads	1,-1	-1,1
tails	-1,1	1,-1

- ▶ Jak se zachovají hráči, pokud nemají PNE?
- ▶ Co znamená, že neexistuje PNE?
- ▶ Budou hráči **umět** hru hrát? Umíte hrát kámen-nůžky-papír?
- ▶ Zopakujme si, že *TH je analytický nástroj pro zkoumání interakcí.*
- ▶ Hráči hru hrají, rozhodují se, takže musí existovat její matematický model.

Příklad hry bez PNE: Matching pennies

A/B	heads	tails
heads	1,-1	-1,1
tails	-1,1	1,-1

Sledujme řádkového hráče. Ryzí BR jsou jasné.

- ▶ Pokud sloupcový hraje $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, pak je řádkový indiferentní (ve svých očekáváních) vůči oběma svým strategiím.
- ▶ Řádkový může jednorázově hrát cokoliv z $(p, 1 - p)$, $p \in \langle 0, 1 \rangle$. Hráči **očekávají** výsledek 0.
- ▶ Může řádkový zvýšit svá očekávání výsledku, resp. může pro sebe **garantovat** lepší výsledek? Pokud řádkový vybočí z rovnovážné strategie na např. $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$, pak se mění sloupcového BR.

Příklad hry bez PNE: Matching pennies

A/B	heads	tails
heads	1,-1	-1,1
tails	-1,1	1,-1

Pokud řádkový vybočí z rovnovážné strategie na např. $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$, pak se mění sloupcového BR.

$$\pi_s((\frac{3}{4}, \frac{1}{4}), heads) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\pi_s((\frac{3}{4}, \frac{1}{4}), tails) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

... tudíž je sloupcového $BR_s((\frac{3}{4}, \frac{1}{4})) = tails$. Pak sloupcový hraje tails.

$$\pi_r((\frac{3}{4}, \frac{1}{4}), tails) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

Řádkový nezlepšil svá očekávání (ani výsledek), naopak zhoršil z 0 na -0.5 , když vybočil z rovnovážné strategie.

Rozhodnutí v:

volba	a	b	c	d
zisk	10	20	40	40

Hráč je indiferentní mezi c a d , tzn. rozhoduje se náhodně podle pravděpodobnostní distribuce $(0, 0, 0.5, 0.5)$.

Přesto je jisté, že dosáhne výsledku 40.

Očekávání ve hře, očekávaný zisk

Jaké je očekávání zisku při loterii:

volba	a	b	c	d
zisk	10	20	30	1000
pravděpodobnost	0.1	0.2	0.6	0.1

$$\pi = 10 \cdot 0.1 + 20 \cdot 0.2 + 30 \cdot 0.6 + 1000 \cdot 0.1 = 123$$

Očekávání je 123 a to i přesto, že s pravděpodobností 0.9 dostanu něco z $\langle 10, 30 \rangle$.

Kdo vytváří ty pravděpodobnosti? Co když je to protihráč?

Vždy nás zajímá Best-Response

	a	b
c	3,2	1,3
d	-1,4	2,1

$\pi_1(p, q) = 5pq - p - 3q + 2$, $\pi_2(p, q) = -4pq + 2p + 3q + 1$
Funkce $\pi_1(p, q)$, kde hráč přemýšlí o nejlepším $p \in \langle 0, 1 \rangle$.

$BR_1(q = (\frac{1}{10}, \frac{9}{10})) \Rightarrow -0.5p - 0.7 \Rightarrow p := 0$, tj. volí d
Problém: $BR_2(d) = \{a\}$, tj. $U_1(d, a) = -1$, tj. uhne do a .

$BR_1(q = (\frac{9}{10}, \frac{1}{10})) \Rightarrow 3.5p - 0.7 \Rightarrow p := 1$

$BR_1(q = (\frac{1}{5}, \frac{4}{5})) \Rightarrow 5p \cdot 0.2 - p - 3 \cdot 0.2 + 2 = 1.4$
Zde již BR není závislé na p , tzn. $BR_1(q = 0.2) = \Delta_1$.
 $MNE = (\sigma_1^*, \sigma_2^*) = ((\frac{3}{4}, \frac{1}{4}), (\frac{1}{5}, \frac{4}{5}))$

Výpočet smíšené rovnováhy analyticky

	a	b
c	3,2	1,3
d	-1,4	2,1

p je pravděpodobnost hraní strategie a , tzn. $1 - p$ je prst hraní b .
Podobně q .

π_i je funkce v proměnných p a q , hledáme její extrém podle p , $\frac{\partial \pi_1}{\partial p}$.

$$\pi_1 = 3pq + 1p(1-q) - 1(1-p)q + 2(1-p)(1-q) = 5pq - p - 3q + 2$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p} = 5q - 1 \Rightarrow q = \frac{1}{5}$$

$$\pi_2 = 2pq + 3p(1-q) + 4(1-p)q + (1-p)(1-q) = -4pq + 2p + 3q + 1$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q} = -4p + 3 \Rightarrow p = \frac{3}{4}$$

Zavedeme pravděpodobnostní rozšíření do strategií, očekávaných zisků a rozhodování.

Definition

Mějme hru Γ . Vektor pravděpodobností $\sigma_i = (\sigma_i^1, \sigma_i^2, \dots, \sigma_i^{|S_i|})$ se nazývá smíšená strategie hráče $i \in Q$ ve hře Γ , pokud platí:

- ▶ $\sigma_i^j \in \langle 0, 1 \rangle$ pro všechna $1 \leq j \leq |S_i|$
- ▶ $\sum_{j=1}^{|S_i|} \sigma_i^j = 1$

Podobně, jako pojem profil, zavádíme i smíšený profil jako vektor smíšených strategií, tedy $\sigma = (\sigma_i)_{i \in Q}$, kde σ_i je smíšená strategie hráče $i \in Q$.

Smíšenou strategii σ_i hráče i interpretujeme jako předpoklad, že hráč i použije svou ryzí strategii $s_j \in S_i$ (zde výjimečně chápeme $S_i = (s_1, s_2, \dots, s_{|S_i|})$ jako vektor) s pravděpodobností σ_i^j .

Smíšená strategie je zobecněním ryzí strategie, neboť $\sigma_i = (\sigma_i^1, \sigma_i^2, \dots) = (1, 0, \dots)$ vyjadřuje ryzí strategii s_i^1 .

Notace: σ je smíšený profil, $s \in S$, $s_i \in S_i$ pro nějaké $i \in Q$

- ▶ $\sigma_i(s_i)$ je pravděpodobnost, že hráč i bude hrát s_i při σ (resp. σ_i)
- ▶ $\sigma_i(s)$ je ekvivalentní zápis

Smíšené rozšíření hry v normální formě

Definition

Mějme hru $\Gamma = (Q; \{S_i\}_{i \in Q}; \{U_i\}_{i \in Q})$.

Hru $\Gamma^m = (Q; \{\Delta_i\}_{i \in Q}; \{\pi_i\}_{i \in Q})$ nazveme smíšeným rozšířením hry Γ , pokud $\forall i \in Q$:

- ▶ Δ_i je množina smíšených strategií hráče i (vektory délky $|S_i|$). $\sigma_i \in \Delta_i$. Číslo $\sigma_i(s_i)$ označuje pravděpodobnost přiřazenou ryzí strategii $s_i \in S_i$ ve strategii σ_i . Celkově $\Delta = \prod_i \Delta_i$.

$$\Delta_i = \left\{ \sigma_i \in \langle 0, 1 \rangle^{m_i} \mid \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1 \right\}; m_i = |S_i|$$

- ▶ Výplatní funkce hráče i

$$\pi_i(\sigma) = \sum_{s \in S} U_i(s) \cdot \left(\prod_{i \in Q} \sigma_i(s_i) \right)$$

Očekávaný zisk (Expected payoff) ve smíšených strategiích

Připomeneme, že v ryzích strategiích při profilu $s \in S$ je očekávaný zisk hráče i dán: $\pi_i(s) = U_i(s)$.

Vektor $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N)$ je smíšený strategický profil hráčů ve hře. Pokud hráči i nehrají konkrétní (ryzí) strategii $s_i \in S_i$, pak musí být očekávaný zisk hráče $i \in Q$ v profilu σ dán pravděpodobnostním váhováním přes všechny ryzí profily $s \in S$.

$$\pi_i(\sigma) = \sum_{s \in S} pmix(s, \sigma) \cdot U_i(s)$$

kde $pmix(s, \sigma)$ je pravděpodobnost profilu $s \in S$ při smíšené strategii σ :

$$pmix(s, \sigma) = \prod_{i \in Q} \sigma_i(s_i)$$

Smíšené rozšíření hry v normální formě

Připomeňme definici smíšeného Nashova ekvilibria (MNE):

Definition

Smíšený profil $\sigma^* \in \Delta$ je ekvilibrium ve hře Γ^m , pokud platí pro všechny $i \in Q$:

$$\sigma_i^* \in BR_i(\sigma_{-i}^*)$$

$$BR_i(\sigma_{-i}) = \arg \left[\max_{\sigma_i \in \Delta_i} \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \right]$$

Pozn.: Předpokládáme, že výsledkem operace $BR_i(\sigma_{-i})$ je podmnožina Δ_i . Množina Δ_i má jiný charakter než S_i ! Z toho plyne.: hráč i je v kontextu sub-profilu σ_{-i} indiferentní mezi všemi $\sigma_i \in BR_i(\sigma_{-i})$.

Otázka: Jak je velká množina $BR_i(\sigma_{-i})$?

Expected payoff: příklad

Pedro/Juana	Box	Balet
Box	3,1	0,0
Balet	0,0	1,3

$$\sigma^* = \left(\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right), \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right) \right)$$

Pedro/Juana	Box	Balet
Box	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$
Balet	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$

$$\frac{3}{16} + \frac{9}{16} + \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

$$\pi_{Pedro}(\sigma^*) = 3 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{3}{16} = \frac{12}{16}$$

Expected payoff: příklad

Pedro/Juana	Box	Balet
Box	3,1	0,0
Balet	0,0	1,3

$$\sigma^* = \left(\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4} \right), \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right) \right)$$

$$\pi_{Pedro}(Box, \sigma_{-i}^*) = 3 \cdot \frac{1}{4} = 1 \cdot \frac{3}{4} = \pi_{Pedro}(Balet, \sigma_{-i}^*)$$

V MNE σ^* bude platit, že je hráč indiferentní vůči všem svým ryzím strategiím, kterým jeho smíšená strategie σ_i^* přiřazuje nenulovou pravděpodobnost.

NE ve smíšených strategiích – MNE (Mixed Nash Equilibrium)

Fakticky stejná definice jako pro PNE, ovšem se zavedením expected payoff (pouze zobecnění).

Definition

Mějme hru $\Gamma = (Q; \{S_i\}_{i \in Q}; \{U_i\}_{i \in Q})$. Smíšený profil $\sigma^* \in \Delta$ nazveme smíšené Nashovo ekvilibrium ve hře Γ , pokud platí pro všechny hráče $i \in Q$ a všechny možné smíšené profily $\sigma \in \Delta$:

$$\pi_i(\sigma^*) \geq \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

Smíšené ekvilibrium: příklad

A/B	L	R
T	1,3	2,1
B	2,1	1,4

$$\sigma^* = \left(\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$\pi_A(\sigma^*) = 1.5$$

$$\sigma = \left((1, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

$\pi_A(\sigma) = 1.5$. Tj., řádkový může hrát stále T , pak ovšem poruší rovnováhu.

Při σ by B hrál něco jiného.

$$BR_i(\sigma_{-i}) = \arg \max_{\sigma_i \in \Delta_i} [\pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i})]$$

Smíšená strategie σ_i^* hráče i je nejlepší odpovědí na smíšený subprofil σ_{-i}^* právě tehdy, když každá z ryzích strategií, kterým σ_i^* přiřazuje nenulovou pravděpodobnost, je nejlepší odpovědí na σ_{-i}^* .

Ověřit na příkladech.

Hráč i je proto při hraní σ_i^* v situaci σ_{-i}^* indiferentní vůči všem ryzím strategiím s nenulovou pravděpodobností (jsou pro něj všechny stejně dobré).

To znamená, že pokud by byly dvě jeho ryzí strategie $s_1^i, s_2^i \in S_i$ s nenulovou pravděpodobností v rámci σ_i^* takové, že by $\pi_i(s_1^i, \sigma_{-i}^*) > \pi_i(s_2^i, \sigma_{-i}^*)$, pak by σ^* nebylo ekvilibrium.

Pochopení smíšených strategií

	a	b
c	3,2	1,3
d	-1,4	2,1
e	4,1	-2,5

e je $BR_1(a)$, přesto se neúčastní MNE; c není BR, ale v MNE je

c do MNE zanáší sloupcový hráč, neboť na něj má vázáno b jako BR

$$MNE = (\sigma_1^*, \sigma_2^*) = \left(\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0 \right), \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right) \right)$$

Theorem

Každá konečná hra má vždy alespoň jeden rovnovážný bod ve smíšených strategiích.

John Nash, 1951

Tento závěr publikoval John Nash ve své práci (*Non-Cooperative Games*, The Annals of Mathematics 54(2)). Ukázal tak koncept ekvilibria ve hrách s nenulovým součtem a současně dokázal, že každá hra má nějaké řešení.

Důkaz si předvedeme ve 4. přednášce.

Co znamená Nashova věta?

- ▶ Konečná hra = množiny strategií hráčů jsou konečné.
- ▶ Víme, že konečná hra má vždy řešení. Zůstává ještě problém ho *najít*.
- ▶ Máme-li bi-maticovou hru $n \times n$, pak má tato hra až 2^{n-1} NE.
- ▶ více: Quint, T., Shubik, M.: A theorem on the number of Nash equilibria in a bimatrix game, International Journal of Game Theory, Volume 26, Number 3 / October, 1997

Theorem

Každá konečná hra má lichý počet Nashových ekvilibrií.

Výpočet Nashova ekvilibria ve smíšených strategiích (MNE)

- ▶ Analýza strategických her ve smíšených strategiích je stále algoritmicky obtížně řešitelný problém.
- ▶ Výpočet MNE je ve složitostní třídě NP (v rámci výzkumu algoritmizace výpočtu MNE byla zavedena specifická třída $PPAD \subset NP$ (Ch. Papadimitriou) a byly publikovány důkazy o příslušnosti výpočtu MNE v N-hráčových maticových hrách k PPAD pro jistá N – zatím ne obecně). Obecně proto přiřazujeme výpočet MNE k NP složitosti.
- ▶ Předvedeme obecný předpis pro řešení dvouhráčových her a v pozdějších přednáškách další složitější algoritmy.

Výpočet řešení pro Matching pennies

A/B	heads	tails	
heads	1,-1	-1,1	p
tails	-1,1	1,-1	$1 - p$
	q	$1 - q$	

p, q jsou pravděpodobnosti strategie "heads", $1 - p$ (resp. $1 - q$) jsou pravděpodobnosti "tails".

Očekávané výplaty:

$$\pi_1(p, q) = 1pq - 1p(1 - q) - 1(1 - p)q + 1(1 - p)(1 - q)$$

$$\pi_2(p, q) = -pq + 1p(1 - q) + 1(1 - p)q - 1(1 - p)(1 - q)$$

$$\pi_1(p, q) = 4pq - 2p - 2q + 1$$

$$\pi_2(p, q) = -4pq + 2p + 2q - 1$$

Výpočet řešení pro Matching pennies

$$\pi_1(p, q) = 4pq - 2p - 2q + 1$$

$$\pi_2(p, q) = -4pq + 2p + 2q - 1$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p} = 4q - 2 = 0 \Rightarrow 4q = 2 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q} = -4p + 2 = 0 \Rightarrow -4p = -2 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

Hra má jediné řešení ve formě Nashova ekvilibria ve smíšených strategiích. Je to

$$s^* = \left(\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

Obecný předpis pro analytický výpočet MNE

Uvažujme hru dvou hráčů s množinami ryzích strategií S_1, S_2 a pravděpodobnostní proměnné p_1, p_2, \dots, p_{m-1} a q_1, q_2, \dots, q_{n-1} , kde $m = |S_1|, n = |S_2|$.

Odvodíme funkce pro očekávané výplaty $\pi_1(p_1, p_2, \dots, p_{m-1}), \pi_2(q_1, q_2, \dots, q_{n-1})$.

Řešíme soustavu lineárních rovnic:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_i} = 0; 1 \leq i \leq m - 1$$

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_j} = 0; 1 \leq j \leq n - 1$$

Každé řešení této soustavy s $p_i \geq 0, q_j \geq 0$ splňující $\sum_i p_i \leq 1, \sum_j q_j \leq 1$ je rovnovážný bod zadané hry.

- ▶ Kreslí se "reakční křivky" – průběh BR na nějakou strategii.
- ▶ Jejich průsečík je ekvilibrium.

Zavedeme nejdříve hru bez PNE (Colonel Blotto Game, defender/invader, Mountain/Plains).

D/I	M	P
M	1,-1	-1,1
P	-1,1	1,-1

Nechť $\sigma_1 = \sigma_1(M)$ je pravděpodobnost, že obránce bude střežit hory, resp. $\sigma_2 = \sigma_2(M)$ útočník napadne obránce přes hory. Očekávané užítky hráčů:

$$\pi_1(M, \sigma_2) = \sigma_2 - (1 - \sigma_2) = 2\sigma_2 - 1$$

$$\pi_1(P, \sigma_2) = -\sigma_2 + (1 - \sigma_2) = 1 - 2\sigma_2$$

$$\pi_2(\sigma_1, M) = -\sigma_1 + (1 - \sigma_1) = 1 - 2\sigma_1$$

$$\pi_2(\sigma_1, P) = \sigma_1 - (1 - \sigma_1) = 2\sigma_1 - 1$$

$$\pi_1(M, \sigma_2) = \sigma_2 - (1 - \sigma_2) = 2\sigma_2 - 1$$

$$\pi_1(P, \sigma_2) = -\sigma_2 + (1 - \sigma_2) = 1 - 2\sigma_2$$

$$BR_1(\sigma_2) = \begin{cases} M & \sigma_2 > \frac{1}{2} \\ P & \sigma_2 < \frac{1}{2} \\ \{M, P\} & \sigma_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

V situaci, kdy $\sigma_2 = \frac{1}{2}$ je naprosto řádkový hráč indiferentní mezi $\{M, P\}$. Z toho plyne, že


$$BR_1(\sigma_2) = \Delta_1$$

$$\pi_2(\sigma_1, M) = -\sigma_1 + (1 - \sigma_1) = 1 - 2\sigma_1$$

$$\pi_2(\sigma_1, P) = \sigma_1 - (1 - \sigma_1) = 2\sigma_1 - 1$$


$$BR_2(\sigma_1) = \begin{cases} M & \sigma_1 < \frac{1}{2} \\ P & \sigma_1 > \frac{1}{2} \\ \{M, P\} & \sigma_1 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Grafické nalezení ekvilibrí, Colonel's game



Grafické nalezení ekvilibria, PNEs+MNEs

FBI/CIA	King	Obyc
King	2,2	0,1
Obyc	1,0	1,1



Grafické nalezení ekvilibrí, PNEs+MNEs


Smíšená strategie je především reakce na preference protivníka (paradox). Mohli bychom si myslet, že v modifikované hře změní CIA své chování.

FBI/CIA	King	Obyc
King	2,4	0,1
Obyc	1,0	1,1

$$\sigma_1 = BR_1(\sigma_2) = \begin{cases} K & \sigma_2 > \frac{1}{2} \\ O & \sigma_2 < \frac{1}{2} \\ [0, 1] & \sigma_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \sigma_2 = BR_2(\sigma_1) = \begin{cases} K & \sigma_1 > \frac{1}{4} \\ O & \sigma_1 < \frac{1}{4} \\ [0, 1] & \sigma_1 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Grafické nalezení ekvilibrí, PNEs+MNEs

FBI/CIA	King	Obyc
King	2,4	0,1
Obyc	1,0	1,1



$$MNE = \left(\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right)$$

Definition

Mějme hru $\Gamma = (Q; \{S_i\}_{i \in Q}; \{U_i\}_{i \in Q})$. Support $\text{supp}(\sigma_i)$ je množina ryzích strategií $s_i \in S_i$ hráče i , kterým smíšená strategie σ_i přiřazuje nenulovou pravděpodobnost $\sigma_i(s_i) \in \langle 0, 1 \rangle$.

Tzn.,

$$\text{supp}(\sigma_i) = \{s_i \in S_i \mid \sigma_i(s_i) > 0\}$$

Množina všech supportů hráče i je rovna $\text{Supp}_i = 2^{S_i} \setminus \{\emptyset\}$, tzn. je jich $|2^{S_i}| - 1$ mnoho.

Základní přístup (silou)

Předpokládejme smíšený sub-profil Δ_{-i} . Je-li $\sigma_i \in BR_i(\Delta_{-i})$, pak je hráč i indiferentní vůči všem ryzím strategiím $supp(\sigma_i)$, tzn.

$$\forall s_i, s_j \in supp(\sigma_i) : \pi_i(s_i, \Delta_{-i}) = \pi_i(s_j, \Delta_{-i})$$

Současně musí platit

$$\sum_{s_i \in supp(\sigma_i)} \sigma_i(s_i) = 1$$

To je počátek pro sestavení soustavy rovnic (lineárních pro dvou-hráčové hry).

Základní předpoklad pro následující algoritmus

Definition

Dvouhráčová hra je tak zvaně nedegenerovaná, pokud žádná smíšená strategie se supportem velikosti k nemá více než k ryzích best-response (pozor! nezkoumáme počet smíšených BR).

Tuto vlastnost snadno poznáme: pokud má hra na ryzí strategii jednoho hráče dvě (a více) ryzích best-response protihráče, je degenerovaná.

Plyne z toho: Kterékoliv Nash ekvilibrium (s_1^*, s_2^*) nedegenerované dvouhráčové hry má supporty stejné délky.

Pro další studium doporučuji: Nisan et al.: Algorithmic Game Theory (link na stránce THE), specificky kapitolu: *Bernhard von Stengel: Equilibrium Computation for Two-Player Games in Strategic and Extensive Form*

Ukázka degenerované hry (příklad od P. Zemka)

	a	b
c	3,3	3,3
d	1,2	2,0

Hra je degenerovaná, neboť na ryzí strategii c má sloupcový hráč best-response $\{a, b\}$.

Navíc vidíme, že hru lze redukovat na $|3,3 \ 3,3|$, kde řádkový hráč volí svou jedinou strategii, ale sloupcový je naprosto indiferentní mezi a a b tak, že jeho $BR_2(c) = \Delta_2$, to znamená, že množina MNE je nekonečná.

Závěr: opět vidíme, že TH nám nedává jednoznačnou odpověď *co se ve hře stane*, ale ukazuje nám, že řádkový hráč má striktně dominantní strategii c a sloupcovému je za této situace naprosto jedno, co bude hrát (nezáleží na tom ani řádkovému).

Výpočet smíšené rovnováhy II.

	a	b
c	3,2	1,3
d	-1,4	2,1

Vycházíme z poznání indiference mezi a a b při hraní smíšené $(p, 1 - p)$ versus smíšené $(q, 1 - q)$.

Pak pro řádkového hráče vychází užitek:

$$U_1(c, a) \cdot q + U_1(c, b) \cdot (1 - q) = U_1(d, a) \cdot q + U_1(d, b) \cdot (1 - q)$$

$$3q + 1(1 - q) = -1q + 2(1 - q)$$

$$3q = -q + (1 - q)$$

$$q = \frac{1}{5}$$

Podobně sloupcový: $2p + 4(1 - p) = 3p + (1 - p) \Rightarrow p = \frac{3}{4}$

Základní přístup (silou) – algoritmus, 2 hráči

Algoritmus je určen pro výpočet všech MNE v dvouhráčových nedegenerovaných hrách. V případě degenerované hry některá ekvilibria neodhalí. V případě více-hráčové hry se změjí lineární rovnice na nelineární, které nejspíš nikdo nechce řešit.

Vstup: Hra $\Gamma = (Q; \{S_i\}_{i \in Q}; \{U_i\}_{i \in Q})$, matice A , resp. B vyjadřující U_1 , resp. U_2 , $m = |S_1|$, $n = |S_2|$.

Výstup: Množina MNE, tzn.

$$MNEs = \{\sigma^* \in \Delta \mid \sigma_i^* \in BR_i(\sigma_{-i}^*); \forall i \in Q\}$$

Nechť $K = \{1, 2, \dots, \min(m, n)\}$

Základní přístup (silou) – algoritmus, 2 hráči

Algoritmus:

1. $\forall k \in K$:
2. $\forall I \subseteq S_1, |I| = k$:
3. $\forall J \subseteq S_2, |J| = k$:
4. Řeš následující soustavu rovnic. Pokud má řešení, pak smíšený profil (x, y) zařaď mezi výsledky. Složky mimo I, J jsou nulové, tzn. $\forall z \in S_1 \setminus I : x_z = 0, \forall z \in S_2 \setminus J : y_z = 0$

Soustava obecně:

$$\sum_{i \in I} x_i b_{ij} = v; \forall j \in J \qquad \sum_{i \in I} x_i = 1$$

$$\sum_{j \in J} a_{ij} y_j = u; \forall i \in I \qquad \sum_{j \in J} y_j = 1$$

Příklad: Matching pennies

A/B	heads	tails
heads	1,-1	-1,1
tails	-1,1	1,-1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; K = \{1, 2\}$$

Řešení pro $k = 1$ zavrhuje rovnou, protože v ryzích strategiích neočekáváme výsledek (víme, že tam není). Strategie heads a tails si přejmenujeme na 1 a 2.

Soustava pro $k = 2, I = \{1, 2\}, J = \{1, 2\}$

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &= u & y_1 - y_2 &= v \\ x_1 - x_2 &= u & -y_1 + y_2 &= v \\ x_1 + x_2 &= 1 & y_1 + y_2 &= 1 \end{aligned}$$

Z toho plyne:

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 &= x_1 - x_2 \\ -2x_1 + 2x_2 &= 0 \\ -2(1 - x_2) + 2x_2 &= 0 \\ -2 + 2x_2 + 2x_2 &= 0 \\ 4x_2 &= 2 \\ x_2 &= \frac{1}{2} & y_2 &= \frac{1}{2} \\ x_1 &= \frac{1}{2} & y_1 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Profil $((\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$ patří mezi řešení PNEs.

Algoritmická složitost řešení "silou"

- ▶ Pro každé $k \in K$ řešíme $\prod_{i \in Q} \binom{|S_i|}{k}$ soustav
- ▶ Pro všechna k je to $\sum_{k \in K} \prod_{i \in Q} \binom{|S_i|}{k}$ soustav
- ▶ U dvouhráčových her jsou to soustavy lineárních rovnic,
- ▶ u vícehráčových her pak soustavy nelineárních rovnic (poněkud obtížné).
- ▶ Výpočet Nashova equilibria je ve složitostní třídě PPAD (2 a více hráčů)

Více: Daskalakis, C., Goldberg, P.W., Papadimitriou, Ch.: *The Complexity of Computing a Nash Equilibrium*, Proceedings of the thirty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing

Hledáme algoritmy, které by řešily MNE efektivněji, tzn. převádí problém výpočtu MNE na jiný ekvivalentní problém, který řeší efektivněji.

- ▶ Lemke-Howsonův algoritmus – pouze pro dvouhráčové hry, pouze jedno ekvilibrum
- ▶ Experimenty s genetickými algoritmy.

Simulační (numerické) řešení her

Chceme modelovat konkrétní strategickou situaci.

- ▶ Počítačová simulace, numerická metoda.
- ▶ Modelujeme fakt, že existuje N hráčů.
- ▶ Modelujeme fakt, že hráči mají množiny strategií S_i .

Jak ovšem vyjádřit užitkové funkce $U_i : S \rightarrow \mathbb{U}$

1. Funkce (zadané analyticky nebo maticí) považujeme za vstup. Někdo nám je dá. Dále hru jenom analyzujeme.
2. Funkce nejsou vstupem. Jsme ovšem schopni sestavit *vnitřní model*, který vyhodnotí pro každý profil $s \in S$, co by se stalo, kdyby hráči hráli strategie s_i . Výsledkem tohoto *experimentu s vnitřním modelem* by byl vektor užiteků hráčů $(u_i)_{i \in Q}$.

Pak je kompletní model dán fázemi:

1. Modelování struktury hry – kdo jsou hráči, jaké mají strategie, co ví o hře, ...
2. Tvorbou vnitřního modelu hry $cm : S \rightarrow \mathbb{U}^N$.
3. Implementací analytických funkcí dle teorie her.

Mějme pak program:

```
for s in S:  
    U[s] := cm(s);  
eq := nashEq(S,U);
```

- ▶ Prostudujeme hry s nulovým součtem
- ▶ Zavedeme metody lineárního programování (matematický základ her)
- ▶ Projdeme algoritmy výpočtu MNE v hrách dvou hráčů, obecný základ
- ▶ Projdeme Nashův důkaz existence ekvilibria
- ▶ Dále pak: opakování ve hře, kooperativnost, vyjednávání, aukce, volby, ...